

Merkblatt Coli

Eigenschaften:

- Bakterium
- Bewohner der normalen Darmflora

Prophylaxe:

- Impfung Muttertier mit Rotavec Corona (Impfdosis: 2ml in Muskel) während der Trächtigkeit zwischen 12 und 3 Wochen vor dem erwarteten Abkalbetermin
- Locatim oral oder Locatim Plus dem Kalb direkt nach Geburt eingeben bzw. unter die Haut spritzen

Ansteckung:

- Direkt nach der Geburt beim Muttertier oder anderen Kälbern über deren Kot

Symptome:

- Starker, wässriger, gelb bis weissen Durchfall sehr schnell nach Geburt
- Manchmal zeigen die Kälber noch keinen Durchfall, liegen aber schon flach und zeigen sehr schnell schlechten Allgemeinzustand

Vorgehen, Behandlung:

- Genügend und genug früh Kolostrum verabreichen
- Kranke Tiere separieren
- Box desinfizieren
- Für erkrankte Kälber sollte ein eigener Nuggi verwendet werden und sie sollten nicht von den kranken zu den gesunden Tieren weitergereicht werden
- Behandlung durch Tierarzt mit Antibiotika und Infusion
- Morgens und abends Milchtränke
- Dazwischen 1-2x täglich Elektrolyttränke (Diaforce, Diakur) oder Tränke ganztags zur Verfügung stellen
- Bi-Pill verabreichen, um eine Übersäuerung zu verhindern (alle 12h 1 Pill bis zum Abklingen der Symptome)
- Stopfende Mittel mit der Milch verabreichen (Stullmisan, Bismutal)