

Merkblatt Cryptosporidien

Eigenschaften:

- Einzeller (Protozoon)
- Umweltkeim
- Zoonose = Übertragung auf den Menschen (v.a. Schwangere und Kleinkinder) möglich!
- Hartnäckig -> Protozoen können bei passenden Lebensbedingungen bis zu 6 Monate infektiös bleiben

Prophylaxe:

- Hygiene/Desinfektion

Ansteckung:

- Direkt nach der Geburt beim Muttertier oder durch andere Kälber über deren Kot
- Indirekt über den Bauern oder andere Personen (Stiefel, Kleider, Tränkegeräte etc.)

Symptome:

- Stinkiger, wässriger, gelblicher Durchfall mit Schleimbeimengungen ab ca. dem 3. Lebenstag bis zur 3. Lebenswoche

Vorgehen, Behandlung:

- Genügend und genug früh Kolostrum verabreichen
- Kranke Tiere separieren
- Box desinfizieren mit Neopredisan 135-1
- Für erkrankte Kälber sollte ein eigener Nuggi verwendet werden und sie sollten nicht von den kranken zu den gesunden Tieren weitergereicht werden
- Bismutal/Stullmisan zum Stopfen
- Morgens und abends Milchtränke
- Dazwischen 1-2x täglich Elektrolyttränke (Diaforce, Diakur) oder Tränke ganztags zur Verfügung stellen
- Bi-Pill verabreichen, um eine Übersäuerung zu verhindern (alle 12h 1 Pill bis zum Abklingen der Symptome)
- Stopfende Mittel mit der Milch verabreichen (Stullmisan, Bismutal)