

Merkblatt Kokzidien (Eimeria)

Eigenschaften:

- Einzelliger Darmparasit
- Hartnäckig -> Eimerien können über Monate infektiös bleiben und teilweise sogar auf der Weide im Winter überleben
- Kokzidien können die Darmwand nachhaltig schädigen und betroffene Tiere können länger bzw. lebenslänglich Probleme aufweisen
- Nach einer durchgemachten Infektion sind die Tiere lebenslang immun

Prophylaxe:

- Hygiene

Ansteckung:

- Oral durch Aufnahme der Parasiten in Einstreu/Umwelt

Symptome:

- Struppiges Fell, blutiger Durchfall ab dem ca. 10. Lebenstag bis Galtlig

Vorgehen, Behandlung:

- Genügend und genug früh Kolostrum verabreichen
- Kranke Tiere separieren
- Behandlung mit Antibiotika (R3/Borgal) mind. 6 Tage oder Baycox
- Box desinfizieren mit Neopredisan 135-1
- Für erkrankte Kälber sollte ein eigener Nuggi verwendet werden und sie sollten nicht von den kranken zu den gesunden Tieren weitergereicht werden
- Bismutal/Stullmisan zum Stopfen
- Morgens und abends Milchtränke
- Dazwischen 1-2x täglich Elektrolyttränke (Diaforce, Diakur) oder Tränke ganztags zur Verfügung stellen
- Bi-Pill verabreichen, um eine Übersäuerung zu verhindern (alle 12h 1 Pill bis zum Abklingen der Symptome)
- Stopfende Mittel mit der Milch verabreichen (Stullmisan, Bismutal)