

# Merkblatt Rota- und Coronaviren

## Eigenschaften:

- Virus

## Prophylaxe:

- Impfung Muttertier mit Rotavec Corona (Impfdosis: 2ml in Muskel) während der Trächtigkeit zwischen 12 und 3 Wochen vor dem erwarteten Abkalbetermin
- Zur «Überbrückung» für Kälber ungeimpfter Tiere: Locatim oral oder Locatim Plus dem Kalb direkt nach Geburt eingeben bzw. unter die Haut spritzen

## Ansteckung:

- Direkt nach der Geburt beim Muttertier oder anderen Kälbern (auch ältere Kälber ohne Symptome) über deren Kot
- Indirekt über Bauern oder andere Personen (Stiefel, Kleider, Tränkegeräte etc.)

## Symptome:

- Wässriger, übelriechender, hellgelber Durchfall in der ca. 1. bis 3. Lebenswoche

## Vorgehen, Behandlung:

- Genügend und genug früh Kolostrum verabreichen
- Kranke Tiere separieren
- Box desinfizieren
- Für erkrankte Kälber sollte ein eigener Nuggi verwendet werden und sie sollten nicht von den kranken zu den gesunden Tieren weitergereicht werden
- Morgens und abends Milchtränke
- Dazwischen 1-2x täglich Elektrolyttränke (Diaforce, Diakur) oder Tränke ganztags zur Verfügung stellen
- Bi-Pill verabreichen, um eine Übersäuerung zu verhindern (alle 12h 1 Pill bis zum Abklingen der Symptome)
- Stopfende Mittel mit der Milch verabreichen (Stullmisan, Bismutal)